

# LEVOPLANT

## Implant contraceptif sous-cutané

Levoplant™ est un implant contraceptif sous-cutané préqualifié par l'OMS, efficace jusqu'à 3 ans. Levoplant™ est une méthode de contraception très pratique et convenable.



## CARACTÉRISTIQUES



Implant contraceptif de haute qualité<sup>1</sup>, abordable, constitué de deux tiges de silicone fines et flexibles



Implant contraceptif préqualifié par l'OMS<sup>2</sup>



Contient 75 mg de lévonorgestrel dans chaque tige (150 mg au total)



Durée de conservation de 60 mois (cinq ans)

## EFFICACITÉ

- Efficacité supérieure à 99 % sur une période de 3 ans – moins d'une grossesse pour 100 femmes pendant la durée d'utilisation<sup>2</sup>

\*Chez les femmes plus corpulentes, l'efficacité du Levoplant peut diminuer vers la fin de la durée du traitement. Un remplacement anticipé peut être envisagé.

## MÉCANISME D'ACTION

- Empêche la libération de l'ovule
- Épaissit la glaire dans le canal cervical pour empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule et de le féconder

## ADMINISTRATION

- À insérer juste sous la peau de la partie supérieure du bras par un professionnel de la santé qualifié à l'aide d'un trocart jetable
- L'insertion et le retrait se font en quelques minutes en milieu clinique et sous anesthésie locale

## AVANTAGES

- Sans œstrogène : évite les effets secondaires liés à l'œstrogène des méthodes contraceptives hormonales combinées
- Une fois l'implant mis en place, il n'est pas nécessaire de prendre d'autres mesures pour éviter une grossesse
- L'implant peut être retiré à tout moment à la demande de la patiente et le retour à la fertilité est instantané
- Presque toutes les femmes, quel que soit leur âge, y compris celles qui viennent d'accoucher, qui allaitent ou qui ont subi un avortement, peuvent utiliser le Levoplant™\*

\*après avis médical

## EFFETS SECONDAIRES

Des saignements irréguliers peuvent survenir, mais ne sont pas dangereux. Des douleurs abdominales, des variations de poids, une sensibilité des seins, des changements d'humeur et des migraines peuvent également être observés.

## CONTRE-INDICATIONS

Saignements vaginaux inexpliqués, cirrhose du foie grave ou tumeur du foie, antécédents de cancer du sein ou caillots sanguins importants.

1. Steiner MJ, et al. Essai randomisé visant à évaluer l'efficacité contraceptive, la sécurité et l'acceptabilité d'un implant contraceptif à deux tiges sur une période de 4 ans en République dominicaine. *Contracept X.* (2019) 1:100006.
2. Département de la santé sexuelle et reproductive et de la recherche de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/SRH) et Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for Communication Programs (CCP), Knowledge SUCCESS. *Family Planning: A Global Handbook for Providers* 4th edition, 2022.