

MISOMIFE-FEM[®] COMBO

Embalagem de 1 comprimido de mifepristona
200 mg e 4 comprimidos de misoprostol 200 mcg.

MISOMIFE-FEM[®] COMBO é uma opção eficaz, de alta
qualidade e segura para o esvaziamento uterino.



CARACTERÍSTICAS



Eficaz e altamente aceita para o tratamento de aborto espontâneo, aborto incompleto e aborto medicamentoso no primeiro trimestre.



É um regime recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para esvaziamento uterino completo sem procedimentos cirúrgicos invasivos.*

*Apenas aplicável ao fabricante específico



Apresentação Disponível:
Embalagem de
5 comprimidos
(1 comprimidos de
mifepristona 200 mg e
4 comprimidos de
misoprostol 200 mcg).



Prazo de
validade de 2
anos.

EFICÁCIA

- Dependendo de quão avançada está a gravidez, o esvaziamento uterino medicamentoso é eficaz em até 96 %.¹

MECANISMO DE AÇÃO

- Mifepristona 200 mg (1 comprimido, administração oral) bloqueia a ação da progesterona que sustenta o que é essencial para manter a gravidez.
- Misoprostol 800 mcg (4 comprimidos x 200 mcg, via oral/sublingual/vaginal) é um análogo sintético da prostaglandina que causa o amolecimento do colo do útero e contração do útero para expelir o produto de concepção.

BENEFÍCIOS

- **Fácil de usar:** A dosagem para este método é simples e direta, tornando-o intuitivo e fácil de administrar.
- **Conveniência:** Pode ser feito em casa com privacidade, sendo uma opção conveniente para quem procura privacidade e conforto durante o processo.
- **Não invasivo:** Este método não exige anestesia ou cirurgia, eliminando a necessidade de procedimentos invasivos e seus riscos associados.

CONTRAINDICAÇÕES

As contraindicações para medicamentos abortivos incluem suspeita de gravidez ectópica, distúrbios hemorrágicos, alergias ou a presença de um DIU.

ADMINISTRAÇÃO

PASSO 1

Após o aconselhamento sobre os métodos de esvaziamento uterino, tome um comprimido de mifepristona com água.



TOME APENAS
1 X MIFEPRISTONA - 200 MG



TOMAR COM ÁGUA



AGUARDAR 24H-36H

O QUE ESPERAR:

- As mulheres podem não ter nenhum sintoma depois de tomar mifepristona.
- Algumas podem sentir náuseas ou começar a sangrar
- Oferecer antieméticos e analgésico

PASSO 2

Passadas 24-36 horas, **administrar 4 comprimidos de 200 mcg de misoprostol** (800 mcg no total) Oferecer um anti-inflamatório não esteroide, como ibuprofeno, para ser tomado 30 minutos antes do misoprostol e um antiemético.

ESCOLHER UM MODO DE ADMINISTRAÇÃO:

PODE SER



4 X MISOPROSTOL - 200 MG



Por via oral, colocar entre a bochecha e a gengiva inferior por 30 minutos e depois engolir com água, ou



Por via sublingual, colocar debaixo da língua por 30 minutos e depois engolir com água, ou



Por via vaginal, empurrar os comprimidos para trás do colo do útero na parte superior da vagina



ESPERAR 30 MINUTOS
E DEPOIS BEBER ÁGUA



O QUE ESPERAR:

- O misoprostol pode causar calafrios, febre, diarreia ou vômitos.
- Passadas 1-4 horas, as mulheres sentirão cólicas dolorosas, hemorragia e coágulos de sangue e tecidos.
- Isto dura várias horas até a gravidez ser terminada.
- As cólicas e a hemorragia irão diminuir, mas a dor pode persistir por 2-3 dias.
- As hemorragias e spotting podem persistir por vários dias ou mais tempo.

CUIDADOS POSTERIORES

- Se a dor ou a hemorragia piorar, ou se não houver hemorragia depois de tomar misoprostol, aconselhar a mulher a procurar ajuda médica.
- Oferecer informações e orientação sobre a contraceção e encaminhar para outros serviços.
- Oferecer ajuda psicológica.
- O follow-up de rotina nem sempre é necessário, confirmar os protocolos locais.

¹ Chen, Melissa J. MD, MPH; Creinin, Mitchell D. MD. Mifepristone With Buccal Misoprostol for Medical Abortion: A Systematic Review. Obstetrics & Gynecology 126(1):p 12-21, July 2015